

Glossario

ADL (Activity of Daily Living) Attività della vita quotidiana, come lavarsi, vestirsi, mangiare, muoversi in carrozzina, scrivere, comunicare ecc. (► anche AVQ).

AIPO Associazione italiana pneumologi ospedalieri.

α-litici Farmaci che riducono la tensione muscolare dello sfintere uretrale interno.

Allodinia Risposta dolorosa conseguente a stimoli di solito non dolorosi.

Amielica (frattura) Frattura vertebrale senza lesione del midollo.

Anticolinergici Categoria di farmaci che producono un “blocco” non selettivo della contrazione del muscolo detrusoriale opponendosi all’azione dell’acetilcolina, il mediatore chimico della contrazione della muscolatura vescicale; sono indicati nella cura della vescica iperattiva.

Areflessia Abolizione dei riflessi.

Artrodesi Intervento chirurgico che ha lo scopo di fissare fra loro due capi articolari.

ASIA (American Spinal Injury Association) Associazione americana che ha proposto la “Classificazione neurologica standard dei traumi midollari”, ossia la scala di valutazione della lesione neurologica.

Atelettasia Mancata o incompleta espansione del polmone o di una parte di esso, con conseguente riduzione del contenuto d’aria.

Atrofia muscolare spinale Malattia delle cellule nervose delle corna anteriori del midollo spinale da cui partono i nervi diretti ai muscoli, che trasmettono i segnali motori (detti anche motoneuroni).

AVQ Attività della vita quotidiana.

Babinski (segno di) Inversione di estensione del riflesso cutaneo plantare.

BIPAP (Bi-level Positive Airway Pressure) Presidio sanitario a supporto della respirazione. Crea una pressione positiva sia durante l’espirazione sia durante l’inspirazione, aumentando la capacità polmonare. Si usa nelle persone con insufficienza ventilatoria.

Bladder scanner Misuratore a ultrasuoni portatile per il rilevamento del grado di riempimento della vescica.

Brindley (stimolatore di) Impianto stimolatore delle radici sacrali anteriori per via extradurale, previa rizotomia sacrale.

Broncoscopio Strumento diagnostico ed esplorativo dell’apparato respiratorio, tramite una fonte di luce, con cui si possono effettuare prelievi biotecnici e aspirazioni delle secrezioni profonde.

Brown-Séquard (sindrome di) Lesione midollare che si presenta con una dissociazione fra danno motorio e sensitivo: al di sotto del livello lesionale compaiono un deficit motorio e la presenza di sensibilità termodolorifica di una parte del corpo, dall’altra parte, invece, si ha un deficit della sensibilità termodolorifica e la presenza di motilità.

Bulbo-cavernoso (riflesso) Si effettua stimolando manualmente il glande o il clitoride. In risposta a questa manovra il muscolo bulbo-cavernoso e lo sfintere anale si contraggono. La presenza del bulbo-cavernoso può indicare un graduale ritorno dell’attività riflessa nelle zone sottostanti la lesione.

Bulking Iniezione endoscopica di materiale biocompatibile per la correzione del ► reflusso vescico-ureterale.

Calcificazione Deposito di calcio nei tessuti para-articolari che comporta una densa ossificazione dei legamenti, delle fasce e dei muscoli che stanno intorno alle articolazioni. Le zone generalmente più colpite sono le anche, le ginocchia, i gomiti e la faccia mediale del femore.

Calcolosi vescicale Formazione di calcoli in vescica.

Capacità vitale (cv) La quantità di aria che riusciamo a espirare dai polmoni dopo aver effettuato un'inspirazione al massimo delle nostre capacità.

Caregiver Colui che si occupa del malato e si assume la responsabilità e il peso dell'assistenza domiciliare.

Case manager (= responsabile del caso) L'operatore che individua i bisogni della persona, costruisce con essa il progetto individuale e attiva le risorse necessarie alla realizzazione del progetto.

Catabolismo Processo di disgregazione di grassi, carboidrati e proteine.

Cateterismo intermittente Svuotamento della vescica per mezzo di cateterismi fatti a orari prefissati.

Cauda equina Parte finale del midollo spinale e connessione delle radici nervose spinali.

Centromidollare (sindrome) Lesione midollare cervicale con interessamento parziale prevalentemente degli arti superiori per lesione delle fibre motorie e del fascio piramidale della zona interessata.

cic (Clean Intermittent Catheterization) Cateterismo intermittente pulito.

Cistografia Esame radiografico della vescica, che viene visualizzata mediante l'immissione di un mezzo di contrasto opaco attraverso il catetere vescicale.

Cistoscopia Esame che consiste nell'osservazione diretta dell'interno della vescica, mediante il cistoscopio, uno strumento invasivo munito di una fonte di luce.

CLP (complesso legamentoso posteriore) Composto dal legamento sovraspinoso, dal legamento interspinoso, dal legamento giallo e dalle capsule delle faccette articolari.

CNOPUS Coordinamento nazionale operatori professionali unità spinali.

Codivilla (molla di) Ortesi costituita da un'asta metallica sagomata gamba-piede e rivestita di cuoio. Viene indicata generalmente nel sostegno del piede cadente.

Comorbilità Presenza di più malattie nella stessa persona.

Concha Sistema di riscaldamento e umidificazione per l'erogazione dell'ossigenoterapia.

Cono midollare Estremità del midollo spinale a livello della seconda vertebra lombare (L₂).

Consulenza alla pari La consulenza alla pari è una relazione di aiuto che si realizza tra persone che sono pari; per "pari" si intendono persone che si trovano nella stessa situazione, che hanno la stessa età, cultura o che condividono una stessa esperienza di vita.

Contrattura Accorciamento dei muscoli che causa una riduzione della mobilità dell'articolazione; è solitamente il risultato di un errato posizionamento e di inattività.

Contrazione ► Spasticità.

CTT (Colon Transit Time) Misurazione del tempo di transito del colon.

cvc (catetere venoso centrale) Viene applicato preferibilmente alla succlavia, alla giugulare esterna o alla femorale.

Dermatomero Area della cute innervata dalla radice sensitiva (posteriore) di un singolo nervo spinale.

DESD (Detrusor External Sphincter Dyssynergia) Disfunzione caratterizzata dalla contemporanea contrazione del detrusore e dello sfintere esterno.

Detrusore Muscolo liscio che riveste la vescica.

Disreflessia autonomica Sindrome che si manifesta nei pazienti con lesione midollare al di sopra della sesta vertebra dorsale (D₆). Uno stimolo, come quello di pienezza intestinale o vescicale, può dare origine a una risposta esagerata di alcuni riflessi a causa dell'interruzione del midollo spinale. Questa risposta, se non controllata, può portare a un grave rialzo della pressione arteriosa. Spesso è preceduta da alcuni sintomi quali sudorazione, orripilazione e rossore, cefalea ecc.

Dissinergia Incoordinazione tra la contrazione della vescica e il rilassamento dello sfintere uretrale esterno.

Diverticolo uretrale Divaricazione della parete dell'uretra causata spesso da infezioni uretrali o da un'errata manovra durante il cateterismo vescicale.

Domotica È lo studio della casa in genere e delle strutture interne in funzione di chi la abita.

DPI (Disabled Peoples' International) Italia ONLUS Sezione italiana del DPI, un'organizzazione mondiale presente in 135 paesi e riconosciuta dalle principali agenzie e istituzioni internazionali ed europee, che lavora per la promozione e la tutela dei diritti umani, per la piena partecipazione, la non discriminazione, la piena inclusione e le pari opportunità delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

EAS (External Anal Sphincter) Muscolo sfintere anale esterno.

EBM (Evidence Based Medicine) Moderna disciplina, basata sull'evidenza, applicata nella pratica clinica della professione medica.

EBN (Evidence Based Nursing) Moderna disciplina, basata sull'evidenza, applicata nella pratica clinica della professione infermieristica.

Edema Gonfiore causato dal ristagno di liquidi nei tessuti.

Eiaculazione retrograda Reflusso dello sperma in vescica.

Ematoma o ecchimosi Raccolta circoscritta di sangue fuoriuscito da vasi arteriosi o venosi.

Ematomielia Emorragia all'interno del midollo spinale.

Embolia polmonare Coagulo di sangue nei polmoni che ostruisce il flusso sanguigno. Spesso è conseguenza di una ▶ TVP.

Empatia Capacità di capire, sentire e condividere i pensieri e le emozioni di un altro in una determinata situazione.

EMG (elettromiografia) Tecnica che consente di valutare l'attività dei muscoli attraverso la misurazione e la registrazione delle correnti elettriche che si generano durante la contrazione. Viene eseguita posizionando dei sensori (placchette di metallo o aghi sottili) vicino o dentro il muscolo da studiare.

ENG (elettroneurografia) Tecnica che consente di valutare i parametri di conduzione dei tronchi nervosi, sia motori sia sensitivi.

Epididimo Primo tratto delle vie spermatiche.

Equinismo Posizione viziata del piede, che si presenta iperesteso.

Ergoterapia ▶ Terapia occupazionale.

Eritema Arrossamento della cute.

FAIP Federazione associazioni italiane paratetraplegici.

FES (Functional Electrical Stimulation) Stimolazione elettrica di uno o più muscoli con applicazioni di elettrodi sulla superficie della pelle o direttamente sul nervo o sui muscoli.

Fisiopress Pressoterapia sequenziale tramite elementi pneumodistensivi contenuti in speciali terminali di forma anatomica applicabili agli arti superiori e inferiori. Questi dispositivi funzionano a pressioni alternate in direzione distale-prossimale al fine di evitare stasi o flussi retrogradi. Previene le trombosi venose profonde (▶ TVP). Il trattamento medio di pressoterapia ha una durata di 180 minuti giornalieri per un ciclo di trenta giorni.

Hodgkin (morbo di) Particolare tipo di linfoma che può causare una mielolesione non traumatica, prevalentemente nella zona dorsale.

ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) Classificazione internazionale del funzionamento della disabilità e della salute. È il nuovo strumento dell'Organizzazione mondiale

della sanità, riconosciuto da 191 paesi per descrivere e misurare la salute e la disabilità delle popolazioni.

Idronefrosi Dilatazione dell'alta via escretrice in seguito a ▶ reflusso vescico-ureterale, infezione, ostruzione da calcolosi o da ▶ dissinergia vescico-uretrale e sovradistensione vescicale.

IMSOP (International Medical Society of Paraplegia) Società medica internazionale per la paraplegia.

INAIL Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Incontinenza urinaria Incapacità di trattenere l'urina. Può essere causata da infezioni urinarie e disfunzioni dello sfintere vescicale.

Iperalgesia Risposta dolorosa incrementata e sproporzionata verso stimoli che sono di solito dolorosi.

Ipercheratosi Eccessivo ispessimento dello strato corneo dell'epidermide (pelle secca).

Iperidrosi Eccessiva produzione di sudore.

Iperreflessia autonomica ▶ Disreflessia autonomica.

ISCOs (International Spinal Cord Society) Società internazionale del midollo spinale.

IVES (Intravesical Electrical Stimulation) Tecnica invasiva che viene effettuata su persone con lesione midollare incompleta con quadri clinici come la vescica iperreflessica e la vescica ipo-areflexica. Tale tecnica si attua attraverso un catetere monopolare introdotto in vescica e connesso a un elettrostimolatore in cui verranno impostati dei parametri base; viene utilizzata per una riabilitazione detrusoriale modulatoria per la stimolazione dei recettori posti sotto la parete, i quali stimolano i centri nervosi centrali.

IVU (infezioni delle vie urinarie) Infezioni batteriche delle vie urinarie.

Laminectomia Resezione dell'arco posteriore di una o più vertebre.

LEA (Livelli essenziali di assistenza sanitaria) Sono le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale (▶ ssn) è tenuto a garantire a tutti i cittadini, gratuitamente o in compartecipazione, grazie alle risorse raccolte attraverso il sistema fiscale.

LEP Potenziali evocati laser.

Lesione completa Lesione del midollo spinale in cui non sono presenti né sensibilità né funzione motoria al di sotto del livello della lesione.

Lesione incompleta Lesione del midollo spinale in cui si trova parte della sensibilità e della funzione motoria al di sotto del livello della lesione.

Lipotimia Condizione caratterizzata da malessere generale, obnubilamento del sensorio, pallore e sudorazione fredda di breve durata, cui a volte fa seguito la perdita di coscienza. È dovuta a una brusca riduzione della perfusione ematica del cervello ed è spesso legata a ipotensione arteriosa.

Litotrissia Frantumazione e asportazione di calcoli vescicali mediante apposito strumento introdotto in vescica per via ureterale.

LMNI (lesione motoneurone inferiore) Tale lesione distrugge il midollo sacrale con abolizione dell'arco riflesso. In questi casi la vescica è areflexica. L'erezione, nel maschio, è prevalentemente di tipo psicogeno.

LMNS (lesione motoneurone superiore) Tale lesione risparmia il centro sacrale e interrompe il passaggio degli stimoli dal midollo sacrale al cervello e viceversa. In questi casi la vescica è iperattiva. L'erezione, nel maschio, è più facilmente di tipo riflesso.

Logopedia Servizio sanitario che si rivolge a persone affette da disturbi della comunicazione conseguenti a cause neurologiche o a cause otorinolaringoiatriche, che colpiscono la lingua parlata e quella scritta, la voce, l'articolazione, la comunicazione interattiva, la masticazione e la deglutizione.

LUTD (Lower Urinary Tract Dysfunction) Disfunzioni del basso tratto urinario.

MAV (malformazione artero-venosa) Lesioni dell'encefalo e/o del midollo spinale, costituite da un groviglio di arterie e vene anomale unite senza la presenza dei capillari.

Megacolon Malattia disfunzionale del grosso intestino, caratterizzata da un'abnorme dilatazione del colon, con conseguente stipsi grave o intrattabile. La causa è spesso una stipsi cronica conseguente a patologie che riducono l'attività motoria dell'intestino.

Metabolismo Insieme di processi fisici e chimici mediante i quali gli organismi producono energia e formano nuova sostanza vivente, bruciando e trasformando gli alimenti.

Mielica Frattura vertebrale con lesione totale o parziale del midollo spinale.

Mielite trasversa Infiammazione acuta del midollo su base virale o batterica. Provoca sempre para/tetraplegia.

Mielografia Esame radiografico invasivo del canale midollare che viene visualizzato mediante puntura lombare con una sostanza opaca.

Miomero Muscolo innervato dalla radice motoria (anteriore) di ogni singolo nervo spinale.

NET (nutrizione enterale totale) Nutrizione artificiale per via naso-gastrica tramite sondino o attraverso gastrostomia o digiunostomia.

Neuromodulazione sacrale Stimolazione sacrale tramite un elettrodo posizionato sulle radici sacrali (S₂-S₄) e collegato a un neurostimolatore.

Nocicettori Recettori in grado di percepire stimoli nocivi all'integrità dell'organismo e di tradurli in sensazione dolorosa, la quale diventa un messaggio trasportato al cervello attraverso fibre nervose.

Nomenclatore tariffario Documento emanato e periodicamente aggiornato dal ministero della Salute che stabilisce la tipologia e le modalità di fornitura di protesi e ausili a carico del Servizio sanitario nazionale (ultimo D.M. 27 agosto 1999, n. 332).

NPT (nutrizione parenterale totale) Infusione nutrizionale per via centrale tramite una sacca nutrizionale ad alto valore calorico bilanciata sui valori degli esami ematochimici.

Orchiepididimite Infiammazione del testicolo e dell'epididimo.

Ortesi Presidio utilizzato per aumentare, migliorare o controllare la funzionalità di parti del corpo presenti ma compromesse, recuperandole alla normale funzionalità (ad es. collare, busto ecc.).

Osteoporosi Malattia degenerativa caratterizzata da decalcificazione delle ossa e atrofia del tessuto osseo.

Outcome Corrispondente inglese dell'espressione italiana "esito atteso".

Pacing diaframmatico Stimolazione elettrica dei nervi frenici. Tale tecnica ha lo scopo di favorire la respirazione nelle persone con grave compromissione dei muscoli respiratori.

Paraplegia Paralisi parziale o totale di entrambi gli arti inferiori e di una parte o di tutto il tronco, in conseguenza a un danno al midollo spinale toracico, lombare o sacrale.

Parestesia Sensazione anomala della superficie cutanea: bruciore, formicolio, pesantezza.

Paronichia Processo infiammatorio della regione periungueale (unghia incarnita).

PEG (gastrostomia endoscopica percutanea) Nutrizione enterale con applicazione chirurgica di una sonda che collega lo stomaco all'esterno.

PEM (potenziali evocati motori) Esame che, grazie all'utilizzo di un particolare strumento in grado di creare un campo magnetico per attivare il tessuto cerebrale, permette di studiare la trasmissione lungo le vie motorie centrali a rapida conduzione.

PES (potenziali evocati somatosensoriali) Esame neurofisiologico che permette di valutare l'integrità di alcune vie nervose specifiche.

PNE (Percutaneous Nerve Evaluation) Tecnica di stimolazione percutanea che consente di verificare l'integrità funzionale delle radici sacrali. È un test che viene eseguito prima di procedere all'impianto definitivo dell'elettrostimolatore.

POAN (para-osteo-artropatia neurogena) Neoformazioni ossee eterotopiche che si formano nei tessuti molli periarticolari.

Pompa al Baclofen Dispositivo sottocutaneo a lento rilascio di Baclofen (farmaco).

Pontino (centro) Regola il controllo volontario del riflesso minzionale e il controllo del coordinamento fra detrusore e sfintere uretrale.

Pott (morbo di) Localizzazione a livello dei corpi vertebrali di un'infezione tubercolare.

Priapismo Persistente erezione patologica del pene.

Probiotico Un alimento integrato con microrganismi vivi.

Protesi Apparecchio sostitutivo di un organo mancante o asportato (ad es. protesi ortopedica, dentaria ecc.).

Protocollo NASCIS (National Acute Spinal Cord Injury Study) A partire dal 1975 sono stati condotti tre studi longitudinali sulle lesioni midollari acute su vasta scala, allo scopo di definire la corretta ed efficace modalità di somministrazione del metilprednisolone nelle lesioni acute midollari da trauma.

Pulsossimetro Apparecchio utilizzato per la misurazione della saturazione di ossigeno del sangue arterioso e delle pulsazioni.

Recettori Strutture anatomiche presenti in particolari punti della superficie cellulare che traducono in impulsi nervosi gli stimoli provenienti dall'esterno e dall'interno del nostro corpo.

Reflusso vescico-ureterale Condizione patologica per cui l'urina passa dalla vescica ai reni o durante la minzione (reflusso attivo) o durante il riempimento della vescica (reflusso passivo).

Residuo urinario Quantità di urina che rimane in vescica dopo svuotamento spontaneo o indotto.

Riduzione della frattura Consiste nel riportare le superfici articolari ai normali rapporti. La riduzione può essere effettuata manualmente, con un sistema di trazione oppure con intervento chirurgico.

Rizotomia sacrale Resezione delle radici posteriori S₂, S₃ e S₄ al fine di eliminare l'iperattività detrusoriale e favorire l'ampliamento della vescica.

ROM (Range of Motion) Normale ampiezza dei movimenti di un'articolazione.

ROT (riflessi osteo-tendinei) Analisi dei riflessi osteo-tendinei degli arti superiori.

SCIM (Spinal Cord Independence Measure) Scala di valutazione funzionale per le persone con lesione midollare che prende in considerazione ed esamina dettagliatamente i progressi e la situazione del paziente nelle ► AVQ.

Scintigrafia renale Studio di medicina nucleare che evidenzia la funzione renale in seguito a iniezione intravenosa di un mezzo di contrasto.

Sclerosi a placche (o sclerosi multipla) Malattia neurologica che colpisce primariamente la sostanza bianca dei nervi con aree di distruzione della guaina mielinica, un tempo denominate placche.

Sfinterotomia Resezione chirurgica per via endoscopica dello sfintere esterno della vescica.

Shock spinale Soppressione completa o parzialmente completa di tutta l'attività riflessa sotto il livello di lesione. Si manifesta dopo trenta/quaranta secondi dal trauma e può durare da pochi giorni a un periodo di sei mesi e oltre.

SIPLES Società italiana di psicologia della lesione spinale.

Siringomielia post-traumatica Cavità cistica che si forma all'interno del midollo spinale.

Sleep apnea (sindrome di Ondino) Disturbi della respirazione durante il sonno.

Sling Benderella di polipropilene che viene posizionata al di sotto dell'uretra per il trattamento dell'incontinenza urinaria femminile.

SOMIPAR Società medica italiana di paraplegia.

Spasticità Abnorme aumento del tono muscolare. Generalmente la spasticità insorge nelle persone con una lesione soprasacrale dopo l'uscita dalla fase dello shock spinale. Può essere causata anche da una serie di disturbi quali infezione urinaria, lesioni da compressione, risposta al dolore ecc.

Sperma Liquido seminale prodotto dagli organi genitali maschili. È composto da spermatozoi, prodotti dai testicoli, e dall'insieme di secrezioni delle ghiandole sessuali accessorie (prostata, ghiandole bulbo-uretrali, vescicole seminali).

Spermatogenesi Processo di formazione degli spermatozoi nei tubuli seminiferi dei testicoli.

Spermogramma Esame del liquido seminale.

SSN (Servizio sanitario nazionale) L'insieme delle funzioni e delle attività assistenziali svolte dai servizi sanitari regionali, dalle istituzioni di rilievo nazionale e dallo Stato per la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività.

SSR (risposta simpatico cutanea) Test che permette di valutare la funzionalità delle vie autonomiche simatiche a livello midollare (cordoni laterali).

Stabilizzazione (intervento di) Intervento chirurgico attraverso il quale viene bloccata una frattura vertebrale con appositi mezzi di sintesi (distrattori o contrattori di Harrington ecc.).

Staminali (cellule) Cellule immature, neonate, non specializzate e potenzialmente in grado di svilupparsi in alcuni tipi di tessuti o addirittura dare origine a qualsiasi tipo di tessuto del nostro organismo.

Stretching Dall'inglese *to stretch* ("allungare, stendere"), insieme di esercizi per favorire l'allungamento muscolare e il rilassamento, l'elasticità muscolare e la mobilità articolare, al fine di accelerare il recupero della fatica e prevenire traumi muscolari.

Terapia occupazionale Trattamento di condizioni patologiche di tipo fisico e psichico attraverso specifiche attività che hanno l'obiettivo di raggiungere il massimo livello di funzione e indipendenza della persona con disabilità in tutti gli aspetti della vita quotidiana.

Tetraplegia Paralisi parziale o totale che interessa i quattro arti e il tronco, compresi i muscoli della respirazione, in conseguenza di un danno al midollo spinale a livello delle vertebre cervicali.

TLICS (Thoracolumbar Injury Classification Severity Score) Classificazione delle fratture della colonna vertebrale toraco-lombare utile per indicare un approccio conservativo o chirurgico.

Tossina botulinica Viene usata per inattivare la muscolatura sfinterica distale facilitando la fuoriuscita dell'urina e prevenendo così le infezioni vescicali ricorrenti e il ► reflusso vescico-ureterale.

TUIP (Transurethral Incision of the Prostate) Incisione prostatica per via transuretrale.

TULIP (Transurethral Laser Incision of the Prostate) Incisione transuretrale della prostata per mezzo di laser e fotocoagulazione.

TURP (Transurethral Resection of the Prostate) Resezione della prostata per via transuretrale.

TVP (trombosi venosa profonda) Coagulo di sangue che ostacola il normale flusso di sangue nel letto venoso.

TVT (Tension-free Vaginal Tape) Tecnica chirurgica in cui un tensore (benderella) di polipropilene viene posizionato per via vaginale attorno all'uretra media con apposito ago e lasciato in sede attraverso ancoraggio sovrapubico esterno, allo scopo di creare una resistenza uretrale sufficiente a prevenire l'incontinenza durante gli aumenti della pressione addominale senza causare un'ostruzione sintomatica.

Uretrocistografia Esame radiografico dell'uretra e della vescica.

Urografia Esame radiografico dell'uretra che viene visualizzata introducendo un mezzo di contrasto attraverso un catetere vescicale.

Uretrorragia Emorragia proveniente dal meato uretrale esterno, indipendentemente dalla minzione.

Urodinamico (esame) Test diagnostico attraverso il quale si studia il comportamento della vescica nelle varie fasi di riempimento, attivazione e svuotamento, e si controlla il grado di coordinazione che si interpone tra muscolatura della vescica e muscolatura degli sfinteri uretrali.

Urografia Esame radiografico che consente la visualizzazione delle vie urinarie mediante iniezione endovenosa di un mezzo di contrasto.

UTI (Urinary Tract Infection) Infezione del tratto urinario.

Vescica neurologica Insieme dei disturbi della minzione dovuti a un'alterazione delle vie nervose che regolano i movimenti della vescica e degli sfinteri uretrali.

Video-urodinamica Esame diagnostico, funzionale e morfologico dell'apparato vescico-sfintero-uretrale.